Dane aktualne na dzień: 29-11-2026 03:52

Link do produktu: https://mojgolab.pl/centrum-zdrowia-golebi-prob-vet-max-125ml-nowoczesny-probiotyk-p-600.html



CENTRUM ZDROWIA GOŁĘBI Prob-Vet Max 125ml - nowoczesny probiotyk

Cena	**35,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Producent	**CENTRUM ZDROWIA GOŁĘBI**

Opis produktu

PROB-VET MAX to płynny probiotyk, opracowany na podstawie najnowszej wiedzy i technologii. W swoim składzie zawiera imponującą ilość wyselekcjonowanych, pozytywnych, żywych kultur bakterii probiotycznych.

Składniki analityczne (w 1l):

popiół surowy 1%, białko surowe 3%, włókno surowe 0%, oleje i tłuszcz surowy 0%, Na 0,03%, lizyna 0%, metionina 0%.

Skład (w 1l):

Melasa z trzciny cukrowej (7.6.1), chlorek sodu (11.4.1) (NaCl).

Dodatki (w 1l):

Zootechniczne: Bacillus subtilis ATCC PTA-6737 ($1*10^7$), Bacillus Subtilis DSM 17299 ($9*10^8$), Enterococcus faecium CECT 4515 ($5*10^9$), Bacillus subtilis DSM 15544 / C-3102, Enterococcus faecium DSM 10663 / NCIMB10415, Bifidobacterium Animalis DSM 16284 ($1,2*10^8$), W składzie **nie występują** substancje modyfikowanych genetycznie.

Zastosowanie

- wspomaga w trakcie zaburzeń przewodu pokarmowego – biegunka,
- uzupełnia prawidłową, pozytywną florę bakteryjną po kuracji antybiotykowej,
- podnosi odporność u młódków (pierwsze dni życia) i dorosłych gołębi,
- w trakcie lotów, podczas intensywnego wysiłku i cotygodniowego kontaktu z kabiną transportową, niweluje ryzyko rozwoju u gołębi niekorzystnych mikroorganizmów i grzybów,
- poprawia apetyt i kondycję.

Instrukcja stosowania

Podawać **1 ml na 1 litr** wody pitnej dla **20-25 gołębi** przez okres 3-5 dni (po antybiotykoterapii). Profilaktycznie **0,5 – 1 ml na litr** wody pitnej 2 razy w tygodniu (1 ml na 10-15 kg m.c.)..

PROB-VET MAX można stosować w formie oprysku otoczenia gołębi (6 ml na 1 litr ciepłej wody w spryskiwaczu/atomizerze). Podając PROB-VET MAX należy jednocześnie zakwaszać wodę, aby osiągnąć optymalne efekty.

Warunki przechowywania

Przechowywać produkt w **chłodnym** pomieszczeniu. Po otwarciu butelki, preparat przechowywać w temperaturze 2-8oC.